

# ➤ Dosages du Plocher G, produit de traitement des lisiers



Plocher G Lisiers  
carbonate de calcium informé

2 kg .....réf ag 1341

10 kg .....réf ag 1351



Plocher G Lisiers  
mélasse informée

1,5 l .....réf ag 1361

8 l .....réf ag 1371

## Dosage lisier bovin



### ➤ Fosse de stockage :

Mélanger 1,5 kg (ou l) avec 50 à 150 litres d'eau pour 100 m<sup>3</sup> de lisier à traiter.

### Dans les bâtiments :

15 g (ou ml) par nouveau m<sup>3</sup> de lisier produit, une fois par semaine ou tous les 15 jours.

## Dosage lisier porcin



### ➤ Fosse de stockage :

Mélanger 1,5 kg (ou l) avec 50 à 150 litres d'eau pour 100 m<sup>3</sup> de lisier à traiter.

### Dans les salles :

15 g (ou ml) par nouveau m<sup>3</sup> de lisier produit, une fois par semaine ou tous les 15 jours.

## Dosage lisier avicole

### ➤ Fosse de stockage :

2 kg (ou 2 litres) pour 100 m<sup>3</sup> de lisier à traiter

### Dans les salles :

**En pré-gavage :** 20 g (ou ml) par nouveau m<sup>3</sup> de lisier produit, 1 fois par semaine

**En gavage :** 0,9 g (ou ml) de Plocher G par animal gavé tous les 12 jours. Au départ, il est conseillé de traiter tous les 6 jours à raison de 0,45 g (ou ml) par animal.

